


Noche anterior

Entre las 5 y las 9 P. M.



Beba 5 o más vasos de 8 onzas (oz) de líquidos claros.*
Termine de tomar los líquidos durante las siguientes 5 horas.

Mañana de

5 horas antes del procedimiento



Beba 4 o más vasos de 8 onzas (oz) de líquidos claros.
Termine de tomar los líquidos 2 horas antes de su colonoscopia o como le recomiende su médico.



La hidratación es importante y es parte de la preparación.
Asegúrese de hidratarse antes, durante y después de la preparación.

Asistente de preparación

La hora de su colonoscopia es _____:_____

Complete su preparación y toda la hidratación para las _____:_____

1

EN EL DÍA ANTERIOR A LA COLONOSCOPIA, deje de comer todo tipo de alimentos sólidos y lácteos y comience a hidratarse tomando líquidos claros.



2

Noche anterior a su colonoscopia

- Beba un frasco de CLENPIQ.
- Hidratar

Beba 5 o más vasos de 8 onzas (oz) de líquido claro.



Inicio: _____:_____

Fin: _____:_____

¡Marque los vasos a medida que los toma!

3

(5 horas antes de la hora de la colonoscopia)

- Beba el otro frasco de CLENPIQ.
- Hidratar

Beba 4 o más vasos de 8 onzas (oz) de líquido claro.



Inicio: _____:_____

Fin: _____:_____

¡Marque los vasos a medida que los toma!

* Después de la primera dosis, si se produce inflamación, hinchazón o dolor de estómago graves, retrase la segunda dosis hasta que se resuelvan los síntomas. Consulte el dorso de la página para obtener más información sobre CLENPIQ, la importancia de una dieta de líquidos claros y la hidratación.

INDICACIONES

CLENPIQ[®] es un medicamento de venta con receta usado por adultos y niños de 9 años de edad en adelante para limpiar el colon antes de una colonoscopia. CLENPIQ limpia el colon produciéndole diarrea. La limpieza del colon ayuda a su proveedor de atención médica a ver el interior del colon con mayor claridad durante su colonoscopia.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- No tome CLENPIQ si su proveedor de atención médica le ha informado que tiene problemas graves de riñón, una obstrucción en el intestino (oclusión intestinal), una apertura en la pared de su estómago o intestinos (perforación intestinal), intestino muy dilatado (megacolon tóxico), problemas para evacuar alimentos y líquidos de su estómago (retención gástrica) o alergia a cualquiera de los ingredientes de CLENPIQ.
- CLENPIQ y otras preparaciones para los intestinos pueden producir efectos secundarios graves, que incluyen pérdida grave de líquidos corporales (deshidratación) y cambios en las sales de la sangre (electrolitos). Es posible que estos cambios produzcan latidos del corazón anormales, que pueden causar la muerte, convulsiones (esto puede suceder incluso si nunca había tenido una convulsión) o problemas de riñón. Sus probabilidades de tener pérdida de líquidos y cambios en las sales de la sangre con CLENPIQ son superiores si tiene problemas del corazón, problemas de riñón o toma diuréticos o medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE).

Consulte la Información de seguridad importante que continúa al dorso.



CLENPIQ®

(sodium picosulfate, magnesium oxide,
and anhydrous citric acid) Oral Solution

10 mg/3.5 g/12 g per 160 mL bottle

¿QUÉ ES CLENPIQ?

CLENPIQ es un medicamento recetado que limpia el colon.
CLENPIQ está listo para beber directamente del frasco. No es necesario mezclarlo ni diluirlo.
No refrigerar ni congelar CLENPIQ.

¿Qué hay en la caja de CLENPIQ?



Dos frascos de CLENPIQ
(5.4 onzas cada uno)



Un vaso de 8 oz para
beber líquidos claros.



La Guía de medicación para el paciente
e Instrucciones de uso para su consulta.

Comience a hidratarse

En el día anterior a su colonoscopia, comience a hidratarse consumiendo solo líquidos claros y deje de comer todo tipo de alimentos sólidos y lácteos.

Asegúrese de hidratarse antes, durante y después de la preparación.

Siga las instrucciones del médico al pie de la letra.

LÍQUIDOS CLAROS ACEPTABLES PARA HIDRATARSE

Agua	Ginger-ale y otros refrescos
Café negro o té	Jugos claros: como jugo de manzana o uvas blancas
Caldo claro o bouillon	Gelatina "Jell-O" regular
Bebidas deportivas	Helado de zumo



LOS LÍQUIDOS NO DEBEN SER ROJOS NI PÚRPURAS. NO CONSUMA ALCOHOL, PULPA DE JUGO, LECHE, CREMA, SUSTITUTOS DE CREMA DE SOYA O NO LÁCTEOS U OTROS LÍQUIDOS OPACOS.

Para obtener más información visite CLENPIQ.com

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONTINUACIÓN)

- Su proveedor de atención médica puede hacerle análisis de sangre después de tomar CLENPIQ para controlar si hay cambios en la sangre. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene cualquiera de estos síntomas como consecuencia de perder demasiados líquidos corporales (deshidratación): vómitos, náuseas, inflamación, mareos, retortijones en el área del estómago (abdominal), micciones con menor frecuencia que la habitual, problemas para beber líquidos claros, problemas para tragar, convulsiones o problemas del corazón.
- CLENPIQ puede producir úlceras intestinales o problemas intestinales (colitis isquémica). Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene dolor intenso en el área del estómago (abdominal) o sangrado rectal.
- Los efectos secundarios más frecuentes de CLENPIQ en adultos incluyen náuseas, dolor de cabeza, niveles altos de magnesio en sangre, deshidratación o mareos y dolor en la zona del estómago (abdominal). Los efectos secundarios más frecuentes de CLENPIQ en niños de 9 a 16 años incluyen náuseas, vómitos y dolor en el área del estómago (abdominal). Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CLENPIQ. Consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

Lo alentamos a que informe los efectos secundarios negativos de los fármacos recetados a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulte la Información de prescripción completa adjunta, incluida la Guía de medicación.