


전날 저녁

오후 5-9시 사이



8온스(oz) 컵의 맑은 액체를 5잔 이상 마십니다.*
다음 5시간에 걸쳐 음료를 모두 마십니다.

당일 아침

절차 5시간 전



8온스(ounce, oz) 컵의 맑은 액체를 4잔 이상 마십니다.
대장내시경 2시간 전 또는 의사가 지시한 대로 음료를 모두 마십니다.



수분 섭취는 중요하며 준비 과정의 일부입니다.
준비 전, 준비 중, 준비 후에 꼭 수분 섭취를 하십시오.

준비 과정 보조 도구

귀하의 대장내시경 일시는 다음과 같습니다: _____:_____

준비 및 수분 섭취를 다음 시간까지 완료합니다: _____:_____

1

대장내시경 전날에는,
모든 고형식 및 유제품
섭취를 중단하고 맑은
음료로 수분 섭취를
시작하십시오.



2

대장내시경 전날 저녁

- CLENPIQ 1병 마시기
- 수분 섭취

8온스(oz) 컵의 맑은 액체를 5잔 이상 마십니다.



시작: _____:_____

완료: _____:_____

음료를 마실 때마다 컵에 체크하십시오!

3

(대장내시경 5시간 전)

- CLENPIQ 나머지 1병 마시기
- 수분 섭취

8온스(oz) 컵의 맑은 액체를 4잔 이상 마십니다.



시작: _____:_____

완료: _____:_____

음료를 마실 때마다 컵에 체크하십시오!

*초회 복용 후에 심한 팽만, 부종 또는 복통이 발생하는 경우, 증상이 해소될 때까지 두 번째 복용을 연기하십시오.
CLENPIQ, 맑은 유동식 및 수분 섭취의 중요성에 대한 상세한 정보는 뒷면을 참조하십시오.

적응증

CLENPIQ®은 대장내시경 이전에 대장을 비워 주는 성인 및 만 9세 이상의 아동용 처방약입니다. CLENPIQ은 설사를 유도하여 대장을 비워 줍니다. 대장을 비움으로써 대장내시경 시 의료 서비스 제공자가 귀하의 대장 내부를 더 명확하게 관찰할 수 있습니다.

중요 안전성 정보

- 의료 서비스 제공자가 귀하에게 중대한 신장 문제, 장 폐색(장 폐쇄), 위 또는 장 복벽의 구멍 뚫림(장 천공), 매우 확장된 장(독성 거대결장), 위장의 음식 및 액체 배출 문제(위 정체) 또는 CLENPIQ의 어느 성분에도 알레르기가 있다고 말한 경우, CLENPIQ을 복용하지 마십시오.
- CLENPIQ 및 기타 장 정결은 중대한 체액 상실(탈수) 및 혈중 염분(전해질) 변화를 비롯한 중대한 부작용을 초래할 수 있습니다. 이러한 변화는 심박 이상을 초래하며, 이는 사망, 발작(이전에 발작을 경험하지 않은 경우에도 발생할 수 있음) 또는 신장 문제로 이어질 수 있습니다. 심장 문제, 신장 문제가 있거나 이뇨제 또는 비스테로이드성 소염제(non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDS)를 복용하는 경우 CLENPIQ으로 인한 체액 상실 및 혈중 염분 변화 가능성이 보다 높습니다.

중요 안전성 정보는 뒷면을 참조하십시오.



CLENPIQ®

(sodium picosulfate, magnesium oxide, and anhydrous citric acid) 경구 용액

160ML 병당 10mg/3.5g/12g

CLENPIQ이란 무엇인가요?

CLENPIQ은 대장을 비워 주는 처방약입니다.
CLENPIQ은 약병에 든 상태로 바로 마실 수 있습니다. 혼합하거나 희석할 필요가 없습니다.
CLENPIQ을 냉장 또는 냉동 보관하지 마십시오.

CLENPIQ 상자는 어떻게 구성되어 있나요?



CLENPIQ 2병
(각 5.4oz)



맑은 음료 섭취용 8oz 컵 1개



참고용 환자 복약지도 및 사용 지침

수분 섭취 시작하기

대장내시경 전날에는 맑은 음료만 섭취하여 수분 공급을 시작하고 모든 고형식 및 유제품 섭취를 중단하십시오.

준비 전, 준비 중, 준비 후에 꼭 수분 섭취를 하십시오.
의사의 지침을 철저히 따르십시오.

수분 섭취용으로 허용되는 맑은 음료

물	진저에일 및 기타 탄산음료
블랙 커피 또는 차	사과 주스 또는 백포도 주스 등의 맑은 주스
맑은 수프 또는 장국	무향 젤라틴
스포츠 드링크	냉동 주스 아이스캔디



음료는 붉은색이나 보라색이어서는 안 됩니다. 알코올, 과육 주스, 우유, 크림, 두유 또는 비유제품 크림, 기타 불투명한 음료는 섭취하지 마십시오.

자세한 내용을 알아보려면 CLENPIQ.com을 방문하십시오.

중요한 안전성 정보(계속)

- 귀하가 CLENPIQ을 복용한 후, 귀하의 의료 서비스 제공자가 혈중 변화를 확인하기 위해 혈액 검사를 실시할 수 있습니다. 지나친 체액 손실(탈수)로 인한 다음 증상 중 무엇이든 경험하는 경우, 즉시 의료 서비스 제공자에게 알려십시오: 구토, 메스꺼움, 팽만, 어지러움, 위 부위(복부) 경련, 평소보다 적은 배뇨 횟수, 맑은 음료를 마시기 어려움, 삼키기 어려움, 발작 또는 심장 문제.
- CLENPIQ은 장 궤양 또는 장 문제(허혈결장염)를 유발할 수 있습니다. 심한 위 부위(복부) 통증 또는 직장 출혈이 있는 경우 즉시 의료 서비스 제공자에게 알려십시오.
- 성인에서 CLENPIQ의 가장 흔한 부작용에는 메스꺼움, 두통, 높은 혈중 마그네슘 수치, 탈수 또는 어지러움 및 위 부위(복부) 통증이 포함됩니다. 만 9-16세 아동에서 CLENPIQ의 가장 흔한 부작용에는 메스꺼움, 구토, 위 부위(복부) 통증이 포함됩니다. 그 외에도 CLENPIQ의 다른 부작용이 있을 수 있습니다. 자세한 정보는 담당 의사 또는 약사에게 문의하십시오.

전문의약품의 부작용을 FDA에 보고하실 것을 권장합니다. www.fda.gov/medwatch 사이트를 방문하시거나 1-800-FDA-1088번으로 전화하십시오.

동봉되어 있는 복약지도를 포함한 전체 처방 정보를 참조하십시오.